

UNE PETITE COLLECTION D'ANNÉLIDES POLYCHÈTES
DES ILES KERGUÉLEN

Par Pierre FAUVEL.

Cette petite collection, recueillie par M. ANGOT, en 1952, à Kerguelen, principalement au Port-aux-Français, au Port-Jeanne-d'Arc et à la Baie-Norvégienne, ne comprend qu'une vingtaine d'espèces, mais fort bien conservées.

M. AUBERT DE LA RÛE m'ayant adressé quelques espèces récoltées par lui, en 1952, au Port-aux-Français, dans les *Macrocystis pirifera* échoués à la côte, je les ai mentionnées avec les précédentes.

Aucune de ces espèces n'est nouvelle pour l'Antarctique.

Hermadion magalhaensi KINBERG.

Port-aux-Français : A. 21, sur les roches, A. 24, flaques, A. 27, cailloux, A. 38, rochers. — Port-Jeanne-d'Arc : A. 4, A. 5, galets et sable. — Baie-Norvégienne : A. 44, A. 46, sable et cailloux.

La plupart de ces *Hermadion* ont la trompe dévaginée et ont encore conservé, en partie, leurs élytres.

M. AUBERT DE LA RÛE en a récolté, au Port-aux-Français, dans les *Macrocystis pirifera*, rejetés à la côte, une quinzaine de spécimens de forte taille, mesurant jusqu'à 60 à 70 mm., sur 20 à 25 mm. de diamètre.

Un fragment d'*Harmothoe* qui les accompagnait n'est malheureusement pas déterminable.

Syllis brachycola EHLERS.

Port-aux-Français : A. 13, revêtement des roches. — Ile Péchenart : A. 30, dans les Algues.

Deux spécimens.

Grubea rhopalophora EHLERS.

Port-Jeanne-d'Arc : A. 48, dans une macération d'Algues.

Une très petite femelle portant ses œufs.

Exogone anomalochaeta BENHAM.

Port-Jeanne-d'Arc : A. 48, dans une macération d'Algues.

Un petit individu. J'ai déjà signalé cette curieuse espèce à Kerguelen parmi celles recueillies par M. PAULIAN dans la Baie-du-Morbihan.

Nereis kerguelensis McINTOSH.

Baie-Norvégienne : A. 41 et A. 42, vase et cailloux.

Le spécimen A. 41 porte un petit denticule au groupe V, ce qui est assez exceptionnel. Les deux petits de A. 42 ont une trompe normale avec $V = O$ et $VI = I + I$ très petits.

Platynereis magalhaensis KINBERG.

Port-Jeanne-d'Arc : A. 2, A. 48, galets et Algues. — Port-aux-Français : A. 8, A. 25, A. 32, A. 45, Cailloux, dragages, Algues. — Ile Péchenart : A. 30, Algues.

Cette espèce, si répandue dans tout l'Antarctique, est représentée par un grand nombre de spécimens de toutes tailles. Ceux de l'île Péchenart sont des jeunes de 4 à 5 mm., avec 18-20 sétigères, et 6 mm. et 28 sétigères, portant des serpes dorsales homogomphes à 4-6 des segments postérieurs. Un de 14 mm. et 32 sétigères n'en a plus. On sait que ces soies spéciales font défaut chez les adultes tandis qu'elles persistent chez *Pl. Dumerilii* AUD.-EDW. C'est à peu près le seul caractère qui distingue ces deux espèces.

M. AUBERT DE LA RÛE en a aussi recueilli un gros spécimen, au Port-aux-Français, dans les *Macrocystis* rejetés à la côte.

Nephtys macroura SCHMARDA.

Port-aux-Français : A. 7 et A. 8, sous les cailloux dans le sable.

Deux grandes entières, à trompe dévaginée et trois petites.

Scolelepis cornigera EHLERS.

Port-aux-Français : A. 16, dans le sable.

Le prostomium de l'unique spécimen étant en mauvais état l'identification reste douteuse. Il était accompagné de deux débris de Spionidiens indéterminables.

Cirratulus cirratus (O. F. MÜLLER).

Port-aux-Français : A. 12, A. 13, A. 22, dans une flaque et dans les revêtements tapissant les roches. — Baie-Norvégienne : A. 39, vase avec cailloux enfoncés.

Le spécimen A. 13 est de très petite taille.

Arenicola assimilis EHLERS, var. *affinis* ASHWORTH.

Port-Jeanne-d'Arc : A. 1, sable. — Port-aux-Français : A. 9, A. 15, A. 36, sable. — Baie-Norvégienne : A. 42, vase avec cailloux enfouis.

Quatre de ces Arénicole du Port-aux-Français sont de grande taille. Celui de Port-Jeanne-d'Arc et celui de la Baie-Norvégienne sont plus petits. Tous ont 7 sétigères antérieurs abranchés et

12 branchifères, donc 19 sétigères au total et appartiennent bien à la variété *affinis*.

Thelepus setosus QUATREFAGES.

Port-aux-Français : A. 10, A. 19, A. 23, A. 24, dans le sable, sous les cailloux, dans les flaques, A. 26, drague. — Port-Jeanne-d'Arc : A. 3, galets et sable. — Baie-Norvégienne : A. 43, vase avec cailloux.

M. AUBERT de la RÛE : Port-aux-Français, dans les crampons de *Macrocystis* rejetés à la côte.

Cette espèce cosmopolite, si commune dans l'Antarctique, est représentée par un grand nombre d'individus de toutes les tailles. M. AUBERT DE LA RÛE en a recueilli près d'une trentaine.

Leprea streptochaeta EHLERS.

Port-aux-Français : A. 14, dans une flaque.

Deux individus dont une femelle bourrée d'œufs et A. 24, dans une flaque, deux spécimens enroulés en spirale comme l'*Amphitrite gracilis* de nos côtes qui présente une certaine analogie mais qui a des soies différentes.

Potamilla antarctica (KINBERG).

Port-aux-Français : A. 6 et A. 17, sous les surplombs de roches. — Pointe Denis : A. 38, sous les surplombs de roches. — Port-aux-Français, M. AUBERT de la RÛE, dans les *Macrocystis* rejetés à la côte.

Plusieurs échantillons sont formés de nombreux tubes cornés de 25 à 30 mm., larges de 2 à 3 mm., dressés, serrés les uns contre les autres et noyés dans une masse spongieuse.

Oridia limbata EHLERS.

Port-aux-Français : A. 13, sur le revêtement des rochers.

Cette très petite *Oridia* possède des otocystes à gros otolithe.

Spirorbis (Paralaeospira) aggregatus CAULLERY et MESNIL.

Port-aux-Français : A. 47, sur les cailloux et les coquilles de Moules.

Ces petits Spirorbes entassés les uns sur les autres en masses compactes de plusieurs centimètres cubes méritent bien leur nom spécifique.

Spirorbis (Paralaeospira) Claparedei CAUL. et MES.

Port-aux-Français : A. 11, sur les Moules, A. 33, sur les frondes de *Macrocystis*.

L'aspect du tube rappelle tout à fait celui du *Sp. borealis* de nos côtes, mais l'animal en diffère par la présence de 4 sétigères thoraciques chez l'adulte. Les jeunes, cependant, n'en ont que trois.

Spirorbis (Paralaeospira) patagonicus CAULLERY et MESNIL.

Pointe Molloy : A. 34, sur les cailloux.

Plusieurs tubes relativement gros, détachés de leur support. Un opercule renferme des œufs.

Spirorbis (Paralaeospira) Lebruni CAULLERY et MESNIL.

Port-aux-Français : A. 27, dragage.

Des gros tubes vides et d'autres plus petits contenant des Spirorbes à 4 sétigères thoraciques. Faute de l'animal, on ne peut décider si les gros tubes appartiennent au *Spi. Lebruni* ou au *Spi. patagonicus*.

(?) *Spirorbis (Romanchella) Perrieri* CAULLERY et MESNIL.

Port-aux-Français : A. 31, dans des crampons de *Macrocystis*.

Un seul gros tube sénestre, ridé, malheureusement vide, semble avoir appartenu à un *Spi. Perrieri* (?).

Laboratoire de Zoologie du Muséum.